

## Labium majus kaynaklı dev pedinküle fibrom: Olgu sunumu

Fatma ÇETİN PELİT \*, Eyyup SABRİ PELİT \*\*

### ÖZET

Vulvar kitleler oldukça ender görülen lezyonlardır. Başlangıçta vulva kaynaklı fibromlar küçük boyutlu olmaları nedeni ile asemptomatiktir. Lezyonların büyümesi ile birlikte fiziksel semptomlar artmakla beraber hastaya psikososyal sorunlarda oluşturmaktadır. Fibromların tedavisinde eksizyon ile kur sağlanabilirken ender olarak rekürrens göstermektedir. Bu olguda genç kadın hastada labium majus kaynaklı ileri derecede büyük, yumuşak ve pediküllü kitle sunulmaktadır.

**Anahtar kelimeler:** Fibrom, vulvar kitle

Vulvar lezyonların büyük bir kısmı malign olmakla beraber birçok benign tümörde görülmektedir<sup>(1)</sup>. Fibromlar bağ dokusundan orijin alan benign karekterde tümörlerdir. Fibromlar vulvanın en sık görülen benign tümörleridir. Vulvada sırası ile en sık l. majus, l. minus, klitoris, vestibül, posterior komissürde yerleşim göstermektedir<sup>(2)</sup>. Genç kadınlarda görülen vulvar lezyonlar sosyokültürel nedenlerden dolayı doktora başvuru süresi uzamış hastalıklardandır. Bu nedenle tanı alanında bu lezyonlar genellikle ileri evrede ve büyük boyatlardadır<sup>(3)</sup>.

Olgumuzda üreme çağındaki genç kadın hastada l. majus orijinli yumuşak kıvamda dev pedinküle fibrom sunulmaktadır.

### OLGU

Yirmi bir yaşında bekâr G0, P0 kadın hasta son 2 yıldır yavaş büyümeye gösteren vulvar kitle yakını-

### SUMMARY

**A giant pedunculated fibroma of labia majora:  
A case report**

Vulvar masses are relatively rare lesions. At the onset of the disease, vulval fibromas are asymptomatic because of their small size. Physical symptoms increase in number with the growth of the mass and they might cause psychological problems. Vulval fibroma can be cured by excision and rarely shows recurrence. This article describes a case of pedunculated, soft fibroma of unusual size originated from the labia majora in a young woman.

**Key words:** Fibroma, vulval mas

ması ile polikliniğe başvurdu. Fizik muayenede sağ labium majus kaynaklanan yaklaşık 10 cmlik pedikül ile uyluk bölgesine uzanım gösteren 20 cm boyutlarında üzeri normal deri ile kaplı elastik kıvamda ağrısız kitle saptandı (Şekil 1). İç genital muayenede herhangibir patoloji saptanmadı. Ultrasonografik görüntülemede yumuşak doku elemanları izlendi, herniasyon ekarte edildi. Lokal anestezi altında kitle eksizyonu ve vulvar rekonstrüksiyon yapıldı (Şekil 2). Eksizyon materyali 250 g ağırlığında, 20x13x6 cm boyutundaydı (Şekil 3).

Mikroskopik incelemede atipisiz keratinize squamoza epitel ile kaplı yumuşak bağ dokusu elemanları izlenmiş olup, tanı fibrom olarak rapor edildi.

### TARTIŞMA

Vulvar fibromlar genellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen benign karekterli tümörlerdir.

**Geliş tarihi:** 30.04.2014

**Kabul tarihi:** 26.10.2014

\* Özel Elbistan Yaşam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

\*\* Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği

**e-mail:** fectin7@gmail.com



Sekil 1.



Sekil 3.



Sekil 2.

İnfantlarda, gebelerde, postmenapozal kadınlarda bildirilmiş olgularda mevcuttur<sup>(4)</sup>. Vulvar fibromlar external genitelyanın mezenkimal dokusundan özellikle dermal bağ dokusundan köken almaktadır. Fakat ender olarak round ligamentin extraperitoneal kısmından ve pelvisin subperitoneal ligamentinden kaynaklanabilir<sup>(5)</sup>.

Fibromlar başlangıçta boyutıyla ilişkili olarak asemptomatiktir, ancak lezyonun büyülüğünün artması ile birlikte, yürümeye zorlanma, fiziksel kısıtlılık, kronik travmaya sekonder olarak yüzeyel ülserasyon gelişebilir<sup>(6)</sup>. Litaratürde fibromların büyük bir kısmı kendi olgumuzda olduğu gibi genel-

likle 2-7 yıl arasında büyüme göstermektedir, ancak ender olarak 20 yıl beklemiş olgularda mevcuttur<sup>(7)</sup>.

Ayırıcı tanıda lipom, inguinal herni, vulvovaginal kistler, ve vulvanın diğer benign kitleleri akılda tutulmalıdır<sup>(8)</sup>. Özellikle bizim olgumuzda da olduğu gibi l. majustan orijin alan fibromlar genellikle pediküllü olup, tanıyı kolaylaştırmaktadır<sup>(7)</sup>.

Sonuç olarak, fibromların komplet eksizyonu ile kür sağlanmaktadır. Ancak litaratürde incomplet eksizyon sonrası rekürrens gösteren olgularda mevcuttur<sup>(9)</sup>. Vulvar fibromlar ender görülen benign tümörlerdir. Komplet eksizyon sonrası kür sağlanabilmektedir.

## KAYNAKLAR

- Leonard VN.** Fibroids tumors of the vulva. *Johns Hopkins Hosp Bull* 1917;28:373.
- Hernandes VMV.** Fibroma de vulva. Reporte de un caso. *Revista de Enfermedades del Tracto Genital Inferior* 2007;1(1):23-6.
- Berlin M, Berlin S.** Fibroma of the vulva: a case report. *J Reprod* 2007;52(6):533-4.
- Wilkinson EJ, Xie D.** Benign diseases of the vulva. In: Kurman RJ, ed. Blaustein's Pathology of the Female Genital Tract. Fifth edition. New Delhi: Springer-Verlag 2002: 37-98.
- Roberto Netto A, Focchi GRA, Ribalta JCL, Giannotti Filho O, Focchi J, Baracat EC.** Fibroma de Vulva (Mol-

- luscum Pendulum): Relato de Caso. *Rev Bras Ginecol Obstet* 2001;23(3):187-90.
6. **Aniekan M Abasiattai, Aniefiok J Umoiyoho, Ivy N Umana, Ntiense M Utuk.** Giant fibroma of the vulva. *BMJ Case Reports* 2010.  
<http://dx.doi.org/10.1136/bcr.05.2010.2985>
7. **Filho LLL, Lopes IMRS, Filho ESF, Neto TRG, Lopes LRS.** Giant soft fibroma located in the vulva: a case report.
- Surg Cosmet Dermatol* 2012;4(2):200-2.
8. **Lima Filho OA.** Fibroma of the vulva: molluscum pendulum. *Rev Gynecol Obstet* 1952;46(4):287-96.
9. **Ajibona OO, Richards CJ, Davies Q.** A distinctive vulval fibroma of so-called prepubertal type in a postmenopausal patient. *J Clin Pathol* 2007;60:437-438.  
<http://dx.doi.org/10.1136/jcp.2006.040428>