

# Şişli Etfal Hastanesi Ve Ülkemiz Kardiotorasik Cerrahi Anestezisi

*ŞİŞLİ etfal hospital anesthesia of cardiothorasic surgery in Our country*

Ayda BAŞGÜL, Ayşe HANCI

Şişli Etfal eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği

## ÖZET

**Giriş:** Hastane ve anestezi tarihçesi ile ilgilenenlere güvenilir bir doküman sağlamak amacıyla torax cerrahi anestezisi kayıtlarından 1092 vakayı sunduk.

**Materyal ve Metod:** Çalışma klinik kayıtlarından retrospektif olarak yapılmıştır. Veriler aritmetik ortalama ve yüzde hesabı ile değerlendirilmiştir.

**Bulgular:** Vakaların %27.57'si pediyatrik, %6.31'i geriatrik yaş grubunda olup K/E oranı 0.62 dir. %41.75'i entübe edilmeyen kısa müdahale olup 6 vakada eter kullanılmıştır. Masif kan transfüzyon oranı %2.47 olup, vakaların %48.07'sinde en az bir ünite kan transfüzyonu yapılmıştır. Vakaların %1.28'inde ise dektran 70, plazma volüm genişletici olarak kullanılmıştır.

**Sonuç:** İntrooperatif mortalite %1.09, postoperatif ilk 24 saatteki mortalite %0.55'dir. Sonuçlar literatürle uyumludur.

**Anahtar Kelimeler:** Anestezi, kardiotorasik cerrahi, tarihçe.

## SUMMARY

**Objective:** To supply a safe and confidential document to the persons who are interested in the history of anesthesia and our hospital, we have presented 1092 case who had taken anesthesia for cardiothorasic surgery.

**Material and Method:** This study was retrospectively worked from our clinic documentation. Data were expressed as mean, median(range) or number.

**Results:** The age group of the patients was; 27.7% pediatric and 6.31% geriatric, the ratio of F/M was found 0.62. 41.75% of the operation was short duration intervention and was used in six cases. Massive blood transfusion was performed to 2.47% of the patients. At least one unit blood was transfused to 48.07 of the cases. As a volume expander, dextran 70 was chosen for the 1.28% of the cases.

**Conclusion:** While the intraoperative mortality rate was 1.09%, postoperative mortality rate in the first 24 hour was found 0.55%. Our results were similar to the literature.

**Key Words:** Anesthesia, Cardiothorasic surgery, History.

## GİRİŞ

Ülkemizin ilk torax cerrahisi ve anestezi klinikleri hastanemizde kurulmuştur(1,2). Hastane ve anestezi tarihçesiyle ilgilenenlere güvenilir bir doküman sağlamak amacıyla 1962-1973 yılları arasında torax cerrahi anestezisi kayıtlarında mevcut 1092 vakayı sunmak istedik.

## MATERYAL VE METOD

Kliniğimiz kayıtlarından; 1092 vakanın yaş gruplarına göre dağılımı, kadın/erkek oranı, seçilen anestezinin

tipi ve özellikleri, intraoperatif ve postoperatif ilk 24 saatteki mortalite yüzdesi, tam kan ve kan ürünü transfüzyonu, kolloid kullanımı verileri araştırılmış, sonuçlar yüzde ve aritmetik ortalama hesabı ile değerlendirilmiştir.

## BULGULAR

Kardiotorasik cerrahi anestizisi, 1962 yılında 9 vaka ile başlamış olup 1973 yılında sonlandırılmıştır. Vakaların yıllara göre dağılımı tablo 1'de sunulmuştur.

Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı dört kategoride incelenmiş olup sonuçlar tablo 2'de sunulmuştur.

## Yazışma Adresi:

Ayda Başgül  
Şişli Etfal Hastanesi 2. An ve Rean Kl.  
Tel: 0212 23 12209-1777 e-mail:abasgul@hotmail.com

Tablo 1: Vakaların yılları dağılımı

| Yıl         | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vaka sayısı | 9    | 51   | 45   | 64   | 71   | 107  | 106  | 162  | 179  | 187  | 106  | 5    |

Tablo 2: Vakaların yaş gruplarına göre dağılımı

| Yaş dağılımı | 1 Yaş ve altı | 1-13yaş | 14-65yaş | 65yaş ve üstü | Toplam |
|--------------|---------------|---------|----------|---------------|--------|
| Vaka sayısı  | 30            | 271     | 722      | 69            | 1092   |
| %            | 2.75          | 24.87   | 66.12    | 6.31          | 100    |

1092 hastanın 416'sı kadınlardır ve vakaların %38.09'unu oluşturmaktadır. Kadın/erkek oranı 0.62 dir. Vakaların %41.75'i (n:476) entübe edilmeyen kısa müdahalelerdir. %58.25 (n:610) vakada ise genel anestezi uygulanmıştır. 1965/1966 yılları arasında 6 vakada eter kullanımına ait kayıt mevcuttur.

İlk açık kalp operasyonu 3.1.1969 yılında 24 protokol nolu 22 yaşında bir kadın hasta ile başlamış olup aynı

yıl 9 açık kalp operasyonu kaydedilmiştir. İlk pulmomat kullanımı da bundan iki yıl sonra 16.3.1971'de gerçekleşmiştir ve yine 34 yaşında bir kadın hastanın açık kalp operasyonunda kullanılmıştır.

İntrooperatif mortalite %1.09 (n:12), postoperatif ilk 24 saatteki mortalite %0.55 (n:6) bulunmuş olup bu vakaların cerrahi endikasyon ve mortalite nedenleri tablo 3'de sunulmuştur.

Tablo 3: İntrooperatif mortalite

| Yıl  | Yaş | Tanı                              | Mortalite sebebi              |
|------|-----|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1963 | 1.5 | Pyopnömotorax, bronş fistülü      | Personel noksantalığına bağlı |
| 1963 | 21  | Mitral stenoz                     | Kanama                        |
| 1963 | 63  | Akciğer kanseri                   | Kanama                        |
| 1964 | 20  | Sağ alt lob bronşiektazi          | Serebral hava embolisi        |
| 1964 | 50  | Mediastinal tümör                 | Serebral hava embolisi        |
| 1964 | 40  | Sol akciğer hava kistleri         | Intratorasik hemoraji         |
| 1964 | 8   | Sağ akciğer konjenital hava kisti | Kayıt yok                     |
| 1966 | 57  | Sağ plevra kanseri                | Kayıt yok                     |

Vakaların %48.07'sinde (n:525) en az bir ünite kan transfüzyonu yapılmış olup masif kan transfüzyon oranı %2.47'dir (n:13). Tam kan dışında bir kan ürünü kullanımı ise kayıtlı değildir. Vakaların %1.28'inde (n:14) plazma volüm genişletici olarak Dextran 70 kullanılmıştır.

### TARTIŞMA

Modern kalp cerrahisi Dr. Gross ile 1938'de, modern açık kalp cerrahisi Dr. Lillehei ve Dr. Varco ile 1955'de başlar. Ülkemizde modern kalp cerrahisi Dr. N. Dorken ve Dr. Fahri Arel ile 1953'de, ilk açık kalp operasyonu Dr. M. Tekdoğan ile 1960'da başlar(1). Ülkemizin ilk

anestezi kliniklerinden biri 1956'da Dr. Cahit Bergil tarafından Şişli Çocuk Hastanesinde kurulmuştur(2). Mevcut kayıtlarımıza göre 1962 ila 1973 yılları arasında 1092 vakada Torax cerrahi kliniğine Dr. Ayhan Sanbay tarafından anestezi verilmiştir. Hastanemizdeki ilk açık kalp operasyonu 1969'da kayıtlı olup dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere oldukça yakındır.

Mc Kenzie 34553 operasyonda 89 ex ile intraoperatif mortaliteyi %0.8 cerrahi, %0.33 anestezi, %0.21 uygulamaya bağlı ölüm olarak sınıflamıştır. Mortaliteyi etkileyen en sık kaçınılabilir faktörler; kontrol edilemeyen hemoraji, kötü postoperatif bakım, kötü preoperatif bakımıdır ve perioperatif ölümlerin

%51'inden sorumludur.(3). Doğrudan anesteziye bağlı ölüm oranını belirlemek güç olmakla birlikte 1/10000 ölümde anestezinin tek başına, 2/10000 oranında başka bir etkenle birlikte sorumlu olduğu kabul edilmektedir(4). Beinlich 1'ya göre anestezi mortalite hızı 1/10000 dir. Ölümlerin çoğunda anestezi uygulamasının dört genel başarısızlığı sorumludur; güç entübasyon, aspirasyon, yetersiz ventilasyon, yetersiz volüm substitüsüyon. Morbi-mortaliteyi tayinde; hastanın yaşı, mevcut hastalıkları, seçilen anestezi tekniği ve anestesiyojolistin deneyimi önemlidir(5). T. Agastian 1976-1993 yılları arasında bronşektazi nedeni ile opere edilen 134 vakada ortalama yaşı 48,4, mortalite hızını %2.2 bulmuştur(7). R. E . Clark 1984-1990 yılları arasında koroner arter by-pass cerrahisi geçiren 29864 vakada gözlenen mortaliteyi

%3.5 bulmuştur(8). Biz 1962-1973 yılları arasında kardiotorasik cerrahi nedeniyle anestezi alan 1092 vakada intraoperatif mortalitenin %1.09 (n:12), postoperatif ilk 24 saatteki mortalitenin %0.55 (n:6) olduğunu gördük. Mortalitenin en yüksek olduğu operasyon bronşektazi idi. En önemli iki mortalite sebebi kontrol edilemeyen hemoraji ve yetersiz ventilasyondu.

## SONUÇ

Ülkemizdeki modern kardiotorasik cerrahının ilk 20 yılında, 1962-1973 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesinde kardiotorasik cerrahide anesteziye ve cerrahiye bağlı peroperatuar mortalite oranı literatür ile uyumlu idi.

## KAYNAKLAR

1. Aytaç A: Dünyada ve Türkiyede Kalp-Cerrahisi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 1:3-12, 1991.
2. Efe S: Hekimlikte 46 yıl-Anılar, ŞEH Vakfı yayınları, 1. Baskı, İstanbul. 108-135,1995.
3. Mc. Kenzie-AG: Mortality associated with anesthesia at Zimbabwean teaching hospitals, (S-Af. Med'j) 86(4):338-42, Apr 1996.
4. Esener Z:Anestezi sırasında ve sonrasında gelişen komplikasyonlar. Klinik Anestezi, 1. Basım, 429-432, Logos yayıncılık, Samsun, 1991.
5. Beinlich I:Anesthesia-related morbidity and mortality, Anesthesial İntestumed Notfaalmed Schmerzther 25(4) p177-85, Jun 1991.
6. Torres-Lopez A, Dolgada-Rodrigues: Anesthetic morbimortality in a general hospital, Rev. Esp Anestesiol Reanim.40(2)p61-8, Mar-Apr 1993.
7. Agastian T, Deschamps C: Surgical management of bronchectasis. Ann Thorac Surg 62:976\_80, 1996.
8. Clark R: Calculating risk and outcome. The society of thoracic surgeons database. Ann Thorac Surg 62:2-5, 1996.