

**1968-1972 YILLARI ARASINDA ŞİŞLİ ÇOCUK HASTANESİ I. ÇOCUK DAHİLİYE  
SERVİSİNDE YATAN HASTALARIN YAŞ, CİNS, TEŞHİS VE PROGNOZ  
BAKIMINDAN İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRİLMESİ (\*)**

**Dr. Nevin Bozbora - Dr. Abdurahman Özsarı - Dr. Berşan Topçu -  
Dr. Engin Canberk - Dr. Gönül Hatipoğlu - Dr. Senay Kutsal -  
Dr. Ümit Müllin - Dr. Ahmet Alver (\*\*)**

1968-1972 yılları arasında Şişli Çocuk Hastanesi, Misbah Muha-  
yeş pavyonu I nci Çocuk Dahiliye servisinde bulunan 15 yatakta ya-  
tan 2014 hasta çocuk istatistikî değerlendirme ile incelenmişlerdir.

*Metod ve materyel:*

1968 ocak ayı başından 1972 aralık sonuna kadar servisimize ya-  
tan 2-16 yaş arası kız ve erkek çocuklar materyelimizi teşkil etmek-  
tedir. Hastalar önce diagnoslarına göre gruplara ayrıldılar. Sayıları  
önce total sonra cinslere göre ayrılarak gösterildi. En sık görüldüğü  
yaşlar ve ayrıca maksimum vak'a adedine göre yaş gösterildi. Komp-  
likasyonlar ve ameliyatlar aynı grupta toplandı. Sonuç haliyle, salah,  
şifa ve vefat olarak neticelendi. Yatma günü en az ve en çok olarak  
gösterildi.

*Tartışma ve netice:*

En çok raslanılan hastalıklar hasta sayısına göre: zehirlenmeler  
bütün hastaların %13,5 nu, A.G. Nefritis % 12,5 nu, Pnömoniler yine  
% 12,5, A.R.F. ise % 9,1 ni teşkil etmektedir. Sonra yüzde Akut gastro-  
enteritis ile birden bire % 4,2 ye düşmektedir. Kan hastalıkları total  
olarak alındığında (çeşitli anemiler % 2,2, Henoch - Sheinlein % 1,3,  
Lösemi % 0,7, Trombositopenik Purpura % 0,5) bütün vak'aların % 5,4  
nü teşkil etmektedir.

Pseudocroup 3-5 yaş arası çocuklarda büyük incidans gösteren bir  
tablodur. Astm bronşial 3 ila 5 yaş arası çocuklarda hırıltılı bronşit  
spastik bronşitle çok karışmış, her ikisi bir arada gösterilmiştir % 2,3.

(\*) Şişli Çocuk Hastanesi 22 Ocak 1975 günü Bilimsel toplantıda tebliğ  
edilmiştir.

(\*\*) Şişli Çocuk Hastanesi I. Çocuk Dahiliye Şef Muavini ve Asistanları.

1968-1972 yılları arasında I. Çocuk Servisinde  
yatan hastalara ait istatistiki bilgiler

Hastalık ismi	Total sayı	Yüzde %	Erkek	Kız	Yaşa göre en yüksek insidans	Komplikasyon	Sonuç	Yattığı gün	
								En az	En çok
Zehirlenmeler	372	%13.5	215	157	3-5 yaş	—	11 vefat	1	3
A. Glomerulo-nephritis	362	%12.5	217	145	5-9 yaş	10 Kalp yetmezliği	243 şifa 89 salah 19 hali ile 4 vefat	2	30
Pnömoni (bronko-atipik pnömoni)	361	%12.5	225	136	3-7 yaş	6 ampiyem 11 plörezi 7 kalp yetmezliği	263 şifa 57 salah 22 hali ile 11 vefat	7	35
A. Rheumatic fever	184	% 9.1	118	66	7-13 yaş	67 kalp yetmezliği 9 Chorea	171 salah 10 hali ile 3 vefat	2	35
A. Gastro-enteritis	85	% 4.2	39	46	3-5 yaş	—	74 şifa 6 salah 5 vefat	1	15
Pseudocrup	76	% 3.7	55	21	3-5 yaş	—	75 şifa 1 vefat	1	5
Astım Bronşial	48	% 2.3	29	19	3-5 yaş	10 spastik bronşit 1 hiler adenopati	45 salah 3 Hali ile	2	15

Hastalık ismi	Total sayı	Yüzde %	Yaşa göre en yüksek insidans		Komplikasyon	Sonuç	Yattığı gün		
			Erkek	Kız			En az	En çok	
Hipertermik konvulsyon	46	% 2.2	37	9	3-4 yaş	1 kollaps	38 şifa 6 salah 3 hali ile 1 vefat	1	7
Rheumatic artrit	45	% 2.2	31	14	7-13 yaş	6 kardit	42 salah 3 hali ile	8	56
Anemi	45	% 2.2	25	20	5-11 yaş	1 herediter sferositoz 3 Glikoz-6 phosphat D. noksanlığı	20 şifa 18 salah 7 hali ile	3.	39
Bronşit	29	% 1.3	16	13	3-6 yaş	—	24 şifa 3 salah 1 hali ile	5	20
Akciğer tbc.	28	% 1.3	18	10	4-8 yaş	7 Peritonit tbc. 1 mezanter adenit	15 salah 13 hali ile	1	32
Henoch-scheinlein	28	% 1.3	17	11	5-13 yaş	1 beyin kanaması 1 purpura fulminans 2 böbrek kanaması	20 şifa 7 salah 1 vefat	10	40
Kriptit anjin	25	% 1.2	17	8	3-13 yaş	—	22 şifa 3 salah	1	6
Hiler adonopati	24	% 1.2	15	9	4-9 yaş	1 adenit tbc.	22 salah 2 hali ile	5	27
Aseptik menenjit	30	% 1.4	13	17	3-9 yaş	—	24 şifa 4 hali ile 2 vefat	4	37

Akciğer tbc. ve hiler adenopati servisimize teşhis maksadı ile yatmış, sonra gerekli yerlere veya evde kontrol altında bakılmak üzere gönderilmişlerdir. Ak. Tbc. % 1,3 H.A. % 1,2.

Nefrotik sendromlu 19 çocuktan, teşhisleri erken yapılan 13 vak'a halen salah hallerini devam ettirmektedirler. 10-13 yaş arası 5 erkek çocukta mide ülseri tesbit edilmiştir. Çocukluk çağlarında oldukça nadir olan bu hastalıktan biri mide prolapsusu idi. Pyelonefritis, Wilms tümörleri, böbrek taşları diğer böbrek hastalıklarını teşkil ediyorlardı. Diğer raslanılan fakat sayı bakımından nadir olan tetani, zona, kist hidatik, kala-azar, akciğer kistleri, mediastinal plörezi, malabsorbsion, kistik pancreas, mezanter arter trombozu, diabetes mellitüs, hypo ve hipertroidiler, osteomyelitis, raşitizm, Ossgut-Shlatter, periarteritis nodosa, scleroderma gibi vak'alara da hastalarımız arasında rastladık.

Hastalarımızda sex bakımından erkek çocuklar çoğunluqtydılar. 1151 erkek, 1093 kız.

En fazla hastalanılan yaş 3-7, maksimum vak'a adedi 3 yaşındaydı. En fazla rastlanılan komplikasyon kalp yetmezliğidir. (R.F.) 67. A.G.N. (10). Burada antiparentez olarak şunu eklemek isteriz: 1974 yılı içinde yatan 82 A.G.N. hastada yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği dikkatimizi çekmiş, vak'aların 52 sinde bulunmuştur, yani % 63 ünde. Türk Pediatri kurumu toplantısında bu noktaya da dikkat çekilerek, suj tayini bakımından araştırılması karara alınmıştır.

En fazla vefat zehirlenmeler (Bilhassa optolidon) ... II, ve Pnömonilerden (II) ., olmuştur. Total vefat sayısı 46, yatan hastanın % 2,2 dir.

### Özet

1968-1972 yılları arasında Şişli Çocuk Hastanesi I. Çocuk Dahiliye servisinde yatan hastaların yaş, cins, teşhis ve prognoz bakımından istatistiki değerlendirilmesi yapılmıştır.

### Summary

On stistical Work had been done at I. Child Department of Şişli Children Hospital between 1968-1972.