



# Özel Durumlarda Tedavi

Doç. Dr. Berna Aksoy

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

## Öz

Akne tedavisi bir bilim olduğu kadar aynı zamanda sanattır. Tedavinin kişiselleştirilmesi ve uygun hastaya uygun tedavi verilmesi kapsamında özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar ve sistemik hastalık varlığı önem arz etmektedir. Akne tedavisi gebe kalmaya çalışanlar, gebe ve emzirenler ile sistemik hastalıkları olanlar için güvenli olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu bölümde gebelik, emzirme ve nöropsikiyatrik, kardiyovasküler, solunum yolu, karaciğer, böbrek ve gastrointestinal sistem hastalıkları gibi bazı sistemik hastalıklar varlığında akne tedavisi irdelenecektir.

**Anahtar Kelimeler:** Akne tedavisi, gebelik, emzirme

## Abstract

Treatment of acne is an art as much as a science. Women at reproductive age and presence of any systemic disease are two important considerations in personalizing the treatment and providing appropriate treatment to appropriate patient. Acne treatment should be organised in a way to be safe for those who try to become pregnant, who are pregnant and breastfeeding, and who have systemic diseases. This section will cover acne treatment in the presence of pregnancy, breastfeeding and some systemic diseases including neuropsychiatric, cardiovascular, respiratory, hepatic, renal, and gastrointestinal.

**Keywords:** Acne treatment, pregnancy, breastfeeding

## Giriş

Gebeler ve emzirenlerde akne tedavisinde kullanılan ilaçların güvenliği ile ilgili bilgiler sınırlıdır, klinik çalışmalara bu grup hastalar dahil edilmediği için elde var olan bilgiler olgu sunumları ve hayvan çalışmalarından elde edilmiştir. Var olan bilgilerin sınırlı olması, yeterli sınıflandırmaların olmaması, teratojenite gibi ciddi yan etki ihtimalinin var olması ve pek çok klinisyenin akneyi kozmetik bir problem olarak kabul etmesi sonucunda gebe ve emziren kadınlarda sıklıkla daha az etkili tedaviler verilmekte ya da hiç tedavi verilmemektedir. Doğurganlık çağındaki kadınlar üreme planları açısından

sorgulanmalı ve tedavi gebe kalmaya çalışanlar, gebe ve emzirenler için güvenli olacak şekilde ayarlanmalıdır. Gebe ve emziren kadınlarda topikal ajanların sistemik emilimlerinin çok düşük olması nedeniyle sistemik olarak kullanılan akne tedavi ajanlarından daha güvenilir oldukları düşünülmektedir<sup>1</sup>.

Bu bölümde gebelik, emzirme ve bazı sistemik hastalıklar varlığında akne tedavisi irdelenecektir. Aynı zamanda nöropsikiyatrik, kardiyovasküler, solunum yolu, karaciğer, böbrek ve gastrointestinal sistem hastalıkları gibi sistemik hastalıklar varlığında da akne tedavisi bazı önemli ayrıntılar içermektedir.

**Yazışma Adresi/Address for Correspondence:** Doç. Dr. Berna Aksoy  
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
E-posta: bernaaksoy@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0003-2346-1865

**Gebelik**

- Gebeliğin fizyolojik belirtilerinden birisi de androjen düzeylerinde yükselme sonucu seborenin artması ve genellikle var olan aknenin kötüleşmesidir<sup>1</sup>.

- Akne tedavisinde kullanılan ilaçların Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) sınıflamasına göre risk kategorileri Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu kategoriler yıllar boyunca uygulamada kaldı, ancak basit olmaları ve gebelik, emzirme ve doğurganlık çağındaki kadın ve erkeklerde ilaçların kullanımı açısından ayrıntılı bilgi içermemeleri nedeniyle zaman içinde değiştirilme gereği duyularak 30.06.2015 yılında Gebelik ve Emzirme Etiketleme Nihai Kuralı uygulamaya girdi. Bu tarihten önce başvuru yapmış ilaçların da zaman içinde bu yeni kurallara göre sınıflandırılması planlandı (<https://www.drugs.com/pregnancy-categories.html>, erişim tarihi 17.05.2019).

- Gebelikte risk tanımlaması için çalışmalardan elde edilen bilgiler kullanılarak; risk yok, düşük, orta, yüksek ve yetersiz bilgi şeklinde sınıflandırılmaktadır. Emzirme döneminde kullanım ile ilgili olarak insan sütünde ilaç mevcudiyeti, emzirilen çocukta ilacın etkileri, ilacın süt üretimine etkileri, klinik değerlendirme ve risk özeti bilgileri bulunmaktadır. Doğurganlık çağındaki kadın ve erkek bölümünde gebelik testi, kontrasepsiyon ve infertilite ile ilgili bilgiler bulunmaktadır (<https://s3.amazonaws.com/public-inspection.federalregister.gov/2014-28241.pdf>)

**Gebelikte topikal akne tedavileri**

-Topikal retinoidler özellikle de tazaroten sistemik emilimleri düşük olsa da teratojen oldukları için gebelikte kullanılmamalıdır<sup>2,3</sup>.

- Benzoil peroksit (BPO) gebelikte sınırlı alanda kullanılabilir<sup>2,3</sup>. BPO deride emildikten sonra benzoik asite metabolize olur, topikal uygulama sonrası maruz kalınan benzoik asit miktarı diyetle alınan benzoik asitten daha azdır<sup>3</sup>.

- Tek başına kullanılan topikal antibiyotiklerden eritromisin, klindamisin ve metronidazolün elde olan az bilgiye istinaden bilinen fetal etkisi yoktur ve gebelikte kullanımı güvenli kabul edilmektedir.

- Topikal salisilik asit eğer kısa süreli ve sınırlı alana uygulanırsa fetal risk oluşturmamaktadır<sup>2,3</sup>.

**Tablo 1. Akne tedavisinde kullanılan ilaçların Gıda ve İlaç İdaresi risk sınıflaması**

FDA risk kategorisi	Form	Terapötik ajan
B	Topikal	Eritromisin, klindamisin, azelaik asit
	Sistemik	Eritromisin, azitromisin, amoksisilin, sefaleksim
C	Topikal	BPO, kombine BPO + eritromisin / klindamisin, tretinoin, adapalen, klindamisin + tretinoin, adapalen + BPO, dapson, salisilik asit
	Sistemik	Trimetoprim +/- sülfametoksazol, spironolakton, kortikosteroidler
D	Topikal	-
	Sistemik	Tetrasiklin, doksisisiklin, minosiklin, flutamid
X	Topikal	Tazaroten
	Sistemik	İzotretinoin, KOK

FDA: Gıda ve İlaç İdaresi, BPO: Benzoil peroksit, KOK: Kombine oral kontraseptifler

- Azelaik asit hafif komedolitik, antibakteriyel ve anti-enflamatuvar etkiye sahip olup FDA tarafından güvenli kabul edilmektedir. Doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılabilir önemli bir alternatiftir<sup>2,4</sup>.

**Gebelikte sistemik akne tedavileri**

- Antibiyotiklerden tetrasiklin, doksisisiklin ve minosiklin kemik ve diş yan etkileri nedeniyle gebelikte önerilmez<sup>2,3</sup>. Tetrasiklinlere ilk trimesterde istemsiz maruz kalınabilmektedir ve bunun sonucunda herhangi bir konjenital malformasyon bildirilmemiştir<sup>1,3</sup>, ancak yine de kullanılmaması önerilmektedir.

- Trimetoprim (TMP) folik asit metabolizmasını etkileyerek ilk trimesterde nöral tüp defektleri, yarık damak ve dudak ile kardiyovasküler ve üriner sistem malformasyonlarına neden olabileceği; sülfonamidler de peripartum dönemde kullanıldığında yenidoğanda kernikterusa neden olabilecekleri için kontrendikedir<sup>3</sup>.

- Gebelikte oral eritromisin ve azitromisin sistemik antibiyotik olarak tercih edilebilse de monoterapi olarak önerilmez<sup>1,3</sup>. Eritromisin her ne kadar gebelikte ikinci ve üçüncü trimesterde güvenli ve birinci seçenek kabul edilse de ilk trimesterde kullanımı sonucu bildirilmiş fetal kardiyak malformasyon olguları bulunmaktadır ve uzun süreli kullanımda gebelerin %10-15’inde hepatotoksisite bildirilmiştir<sup>1</sup>. Gebelikte eritromisin estolat ikinci trimesterde annede %10 oranında hepatotoksisiteye neden olacağı için kullanılmaz. Gebelikte eritromisin baz ya da eritromisin etilsüksinat kullanılmalıdır<sup>3</sup>.

- Azitromisin hakkında bilgilerimiz sınırlıdır ve eritromisinden sonra ikinci tercih olarak önerilmektedir<sup>3</sup>.

- Amoksisilin ve sefaleksim akne tedavisi uygulanan gebe hastalarda adjuvan tedavi olarak tercih edilecek antibiyotiklerdendir<sup>1,2</sup>.

- Kombine oral kontraseptifler (KOK) gebelikte önerilmez. KOK kullanımı öncesi gebelik testi yapılmalıdır<sup>2</sup>.

- Spironolakton gebelikte erkek fetüste feminizasyona neden olabileceği için kontrendikedir<sup>2</sup>.

- Sistemik izotretinoin gebelik kategorisi X olduğu için gebelikte ya da gebelik planlayan kadın hastalarda kontrendikedir<sup>1,2</sup>.

**Emzirme**

- Emzirme döneminde ilaç kullanımı açısından en sık kullanılan risk sınıflama sistemleri Amerikan Pediatri Akademisi ve yakın zamanda yayınlanan Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından oluşturulan ilaç ve Emzirme veri tabanıdır<sup>1</sup>. Akne tedavisinde kullanılan ilaçların emzirme döneminde sınıflandırılması Tablo 2’de gösterilmiştir.

**Emzirme döneminde topikal akne tedavileri**

- Topikal retinoidlerden adapalen, tretinoin ve tazarotenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir<sup>2</sup>. Adapalen vücutta geniş yüzeylere uygulanmadığı takdirde sistemik emilimi düşük miktarda olacağı için emzirme döneminde kullanılabilir. Tretinoin doğal A vitamini izomeri olduğu için normalde anne sütünde bulunabilmektedir, topikal uygulama sonrası sistemik emilim düşük miktarda olacağı için emzirme döneminde kullanımı güvenlidir<sup>5</sup>. Tazaroten topikal olarak vücutta geniş yüzeylere uygulanmadığı takdirde sistemik emilimi çok düşük miktarda olacağı için emzirme döneminde kullanımı orta düzeyde güvenlidir<sup>3,5</sup>.

- Topikal BPO’nun emilerek insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir<sup>2</sup>. Emzirme döneminde kullanılmaya uygundur<sup>1,5</sup>.

- Salisilik asit emzirme döneminde kullanılmamalı ya da kullanılacak ise emzirme kesilmelidir. Eğer emzirme döneminde kullanılırsa göğüs bölgesine uygulamadan kaçınılmalıdır.

- Eritromisin ve klindamisin topikal uygulama sonrası anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir<sup>2</sup>. Topikal eritromisin, klindamisin ve metronidazol emzirme döneminde güvenlidir ve kullanılabilir<sup>1,5</sup>.
- Topikal olarak uygulanan azelaik asit anne sütüne minimal düzeyde geçmektedir ve emziren annelerde kullanımı güvenlidir<sup>2,4</sup>.
- Dapson anne sütüne geçmektedir. Emzirilen infantlarda oral dapsonun yan etkilere neden olduğu bilindiği için, topikal dapson akne tedavisinde emzirme sırasında kullanılmamalı ya da mutlaka kullanılacak ise emzirme durdurulmalıdır<sup>2</sup>.

### Emzirme döneminde sistemik akne tedavileri

- Tetrasiklin, doksisisiklin ve minosiklin anne sütüne geçmektedir, ancak anne sütünde kalsiyuma güçlü bir şekilde bağlandığı için infant

maruziyeti düşük oranda gerçekleşmekte ve emzirme döneminde kısa süreli (<3 hafta) kullanımı güvenli kabul edilmektedir<sup>1,3,5</sup>.

- TMP-sülfametoksazol (SMX) anne sütüne geçer<sup>2</sup>. Bebek prematür, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ya da ciddi sarılığa sahip değilse emzirme döneminde TMP-SMX kullanımı güvenli kabul edilmektedir.
- Sistemik eritromisin ve azitromisin anne sütüne geçer ancak emziren annelerde güvenli kabul edilmektedir<sup>1,5</sup>. Eritromisin erken postpartum dönemde infantil hipertrofik pilor stenozuna neden olabileceği için kullanılmamalıdır<sup>3,5</sup>.
- Amoksisilin ve sefalekssin infant için minimal risk taşıdığı için emzirme sırasında akne tedavisinde güvenli adjuvan tedavi olarak kullanılabilirler<sup>2,5</sup>.
- KOK'ler emzirme döneminin ilk 6 haftasında önerilmezler. Doğum sonrası 6 hafta ile 6 ay arasında dikkatli ve özel takiple kullanılmaları önerilir. Emzirme döneminde etinil estradiol ve norgestimate içeren KOK'ler adjuvan tedavi olarak kullanılabilir. Ancak noretindron asetat ve drospirenon içeren KOK'lerin infant üzerine etkileri tam olarak bilinmediği için Dünya Sağlık Örgütü tarafından emzirme döneminde kullanılmamaları önerilmektedir. Amerikan Pediatri Akademisi ise drospirenon içeren KOK'lerin emzirme sırasında kullanılabilirliğini belirtmektedir. Spironolakton infant için minimal risk taşıdığı için emzirme sırasında kullanılabilir<sup>2</sup>.
- Sistemik izotretinoin emzirme sırasında kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır<sup>2</sup>. Ancak infantta ciddi toksisiteye neden olabileceği ve anne sütüne geçebileceği için emzirme döneminde kullanılmamalıdır<sup>5</sup>.

### Nöropsikiyatrik hastalıklar

- Topikal (tek başına ya da kombinasyon halinde) veya oral yolla kullanılan klindamisin nöromusküler bloke edici özellikler taşıdığı için diğer nöromusküler bloke edici ajanlar ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Topikal dapson yan etki olarak baş ağrısı, depresyon, intihar girişimi, psikoz ve tonik klonik kasılmalara neden olabileceği için nöropsikiyatrik hastalıkları olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Topikal dapson ayrıca antikonvülzanlar ile etkileşime gireceği için birlikte kullanılmamalıdır<sup>2</sup>.
- Minosiklin konvülsiyonlara neden olabileceği için epilepsi hastalarında kullanılmamalıdır.
- Doksisisiklin de antikonvülzanlarla etkileşime gireceği için yine epilepsi hastalarında kullanılmamalıdır.
- Sistemik eritromisin, azitromisin ve amoksisilin konvülsiyonlara neden olabileceği için epilepsi hastalarında kullanılmamalıdır<sup>2</sup>.
- Fokal nörolojik belirtilerle seyreden baş ağrısı (migren) olan hastalarda KOK'ler kontrendikedir. KOK'ler depresyon ve duyu durumu değişikliklerine neden olabileceği için psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. KOK'ler ayrıca antikonvülzan ilaçlar ile etkileşime girdiği için birlikte kullanılmamalıdır<sup>2</sup>.
- Sistemik izotretinoin psödötümör serebri ve nöbetlere neden olabilir. Psödötümör serebri gelişme riski nedeniyle sistemik izotretinoin ile eşzamanlı olarak sistemik tetrasiklin, doksisisiklin veya minosiklin kullanılmamalıdır<sup>2</sup>.
- Sistemik izotretinoin kullanımı ile ilgili duyu durumu değişiklikleri, depresyon, intihar ve psikoz geliştiğini belirten yayınlar olduğu için psikiyatrik hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalı<sup>2</sup> ve bipolar bozukluğu olanlarda atakları tetikleyebileceği için kullanılmamalıdır. Hastalar sistemik izotretinoin tedavisi öncesi ve sırasında psikiyatrik açıdan değerlendirilerek dikkatli takip edilmelidir<sup>2</sup>.

**Tablo 2. Akne tedavisinde kullanılan ilaçların emzirme döneminde kullanımları ile ilgili sınıflandırılması**

Form	Terapötik ajan	Amerikan Pediatri Akademisi Sınıflaması	İlaç ve Emzirme veri tabanı sınıflaması
Topikal	BPO	Sınıflandırılmamış	Düşük risk
	Topikal antibiyotikler (eritromisin, klindamisin)	Uygun	Kabul edilebilir
	Topikal retinoidler (tretinoin, adapalen, tazaroten)	Sınıflandırılmamış	Düşük risk
	Azelaik asit	Sınıflandırılmamış	Düşük risk
	Dapson	Uygun	Yenidoğan, prematür ve G6PD eksikliğinde kaçınılmalı
	Salisilik asit	Sınıflandırılmamış	Sınıflandırılmamış
Sistemik	Tetrasiklinler (tetrasiklin, doksisisiklin, minosiklin)	Uygun	Kısa süreli kullanım kabul edilebilir
	Makrolidler (eritromisin, azitromisin)	Uygun	Kabul edilebilir
	Trimetoprim +/- sülfametoksazol	Uygun	Sarılığı olan, prematür ve hasta infantlarda kaçınılmalı
	İzotretinoin	Sınıflandırılmamış	Öneri yok (kullanılmamalı)
	KOK	Uygun	Postpartum ilk 4 hafta kaçınılmalı
	Spironolakton	Uygun	Kabul edilebilir görünmekte
	Flutamid	Sınıflandırılmamış	Öneri yok
	Kortikosteroidler	Uygun	Kabul edilebilir

BPO: Benzoil peroksit, G6PD: Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, KOK: Kombinasyon oral kontraseptifler

- Ciddi depresyon ve psikoz varlığında intralezyoner steroid enjeksiyonları kontrendikedir<sup>2</sup> (Tablo 3).

#### Kardiyovasküler sistem hastalıkları

- Sistemik eritromisin ve azitromisin çarpıntı, aritmi, QT aralığı uzaması ve Torsade de Pointes sendromuna neden olabilecekleri için kalp ritim bozukluğu olan ve antiaritmik kullanan hastalarda kullanılmamalıdır<sup>2</sup>.

- Tıbbi öyküsünde serebrovasküler hastalık, kalp damar hastalığı, komplikasyonlar ile birlikte kalp kapak hastalığı, derin ven trombozu, tromboembolik hastalıklar öyküsü olan, kan basıncı 160/100 mmHg'den daha yüksek veya ciddi hipertansiyonu olan hastalarda KOK'ler kontrendikedir. KOK kullanımı öncesi kan basıncı ölçümü yapılmalıdır<sup>2</sup>.

- Kalp yetmezliği ve ciddi hipertansiyonu olan hastalarda intralezyoner steroid enjeksiyonları kontrendikedir<sup>2</sup> (Tablo 3).

#### Solunum yolu hastalıkları

- Topikal olarak uygulanan klindamisin ve kombine klindamisin ile tretinoin preparatları yan etki olarak nazofarenjit, sinüzit, faringolarenjyal ağrı ve öksürüğe neden olabileceği, klindamisine bağlı pnömonit bildirilmiş olduğu için solunum yolu hastalıkları olanlarda dikkatli kullanılmalıdır<sup>2,6</sup>.

- Dapsonun eozinofilik pnömonit yapabildiği bildirilmiş ve yan etki olarak grip, farenjit, nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit ve öksürüğe neden olabileceği için topikal dapson preparatları solunum yolu hastalıkları olanlarda dikkatli kullanılmalıdır<sup>2,7</sup>.

- Minosiklin bronkospazm, pnömonit ve astım alevlenmesine neden olabileceği için kronik solunum yolu hastalığı (astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı) olanlarda kullanılmamalıdır<sup>2</sup>.

- Aktif tüberkülozu olan hastalarda yüksek dozda intralezyoner steroid enjeksiyonu uygulanmamalıdır<sup>2</sup> (Tablo 3).

**Tablo 3. Sistemik hastalık varlığında dikkatli kullanılması gereken akne tedavi ajanları**

Sistemik hastalık	Dikkatli kullanılması gereken tedavi ajanları
Nöropsikiyatrik	Topikal klindamisin, dapson Sistemik klindamisin, doksisisiklin, minosiklin, eritromisin, azitromisin, amoksisilin, izotretinoin, KOK İntralezyoner steroidler
Kardiyovasküler	Sistemik eritromisin, azitromisin, KOK İntralezyoner steroidler
Solunum yolu	Topikal klindamisin - tretinoin kombinasyonu, dapson Sistemik minosiklin İntralezyoner steroidler
Karaciğer	Topikal salisilik asit Sistemik minosiklin, doksisisiklin, tetrasiklin, TMP-SMX, eritromisin, azitromisin, amoksisilin, KOK, flutamid
Böbrek	Sistemik minosiklin, TMP-SMX, amoksisilin, sefaleksim, spironolakton
Gastrointestinal	Topikal eritromisin, klindamisin, dapson Sistemik tetrasiklin, doksisisiklin, minosiklin

KOK: Kombine oral kontraseptifler, TMP: Trimetoprim, SMX: Sülfametoksazol

#### Karaciğer ve böbrek hastalıkları

- Varisella ya da influenza benzeri hastalığı olan çocuklarda topikal salisilik asit preparatlarının kullanımı artmış Reye sendromu gelişimi riski nedeniyle önerilmez<sup>2</sup>.

- Tetrasiklin, doksisisiklin ve özellikle de minosiklin hepatotoksisite, hepatit ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Aynı zamanda doz bağımlı olarak kan üre azotunun yükselmesi, nefrit ve böbrek yetmezliğine neden olabilirler<sup>2</sup>.

- Doksisisiklin karaciğerde metabolize edildiği için renal hastalığı olanlarda güvenle kullanılabilir<sup>1</sup>.

- TMP-SMX ileri düzeyde karaciğer ve böbrek bozukluğu olanlarda kontrendikedir. TMP-SMX kolestatik sarılık, hepatit, karaciğer nekrozu, nefrit ve böbrek yetmezliğine neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır. Aynı zamanda serum transaminaz, bilirubin, kan üre azotu ve kreatinin düzeyi yükselmesine neden olarak kreatinin testi ile etkileşebilir<sup>2</sup>.

- Sistemik eritromisin ve azitromisin karaciğerde kolestatik sarılık ve hepatik fonksiyon bozukluğuna neden olabilir, bu nedenle daha önceki kullanımında bu yan etkiler gelişen hastalarda kontrendikedir<sup>2</sup>.

- Sistemik amoksisilin kullanımı sırasında transaminaz düzeylerinde yükselme, kolestatik sarılık ve hepatit görülebileceği için karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır<sup>2</sup>.

- Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda amoksisilin ya da sefaleksim kullanımı sırasında doz ayarlaması yapılmalıdır<sup>2</sup>.

- Anormal karaciğer fonksiyon bozukluğu ile beraber olan hepatoselüler hastalık, hepatik adenom ve karsinom, gebelikte kolestatik sarılık öyküsü ya da daha önceki KOK kullanımı ile sarılık öyküsü olan hastalarda KOK kullanımı kontrendikedir<sup>2</sup>.

- Böbrek yetmezliği olan hastalarda spironolakton kullanımı kontrendikedir<sup>2</sup>.

- Karaciğer yetmezliği olan hastalarda flutamid kontrendikedir ve tedavi öncesi mutlaka karaciğer fonksiyon testleri değerlendirilmelidir<sup>2</sup> (Tablo 3).

#### Gastrointestinal hastalıklar

- Topikal (tek başına ya da kombinasyon halinde) veya oral yolla kullanılan eritromisin ve klindamisin psödomembranoz kolite neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır<sup>2</sup>.

- Topikal (tek başına ya da kombinasyon halinde) veya oral yolla kullanılan klindamisin rejyonel enterit, ülseratif kolit veya antibiyotik ilişkili kolit öyküsü varlığında kontrendikedir<sup>2</sup>.

- Topikal dapson yan etki olarak karın ağrısı, şiddetli kusma ve pankreatit gelişimine neden olabileceği için öyküde bu belirtileri ve pankreatit riski olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır<sup>2</sup>.

- Tetrasiklin, doksisisiklin ve minosiklin kullanımında görülebilen çeşitli gastrointestinal sistem yan etkilerinin yanısıra özofajit ve özofageal ülserasyon riski taşınması nedeniyle bu ilaçların doğru kullanımı (bol su ile alınması ve kullanım sonrası en az yarım saat dik kalınması) konusunda hastalar eğitilmelidir (Tablo 3).

#### Kaynaklar

1. Tan AU, Schlosser BJ, Paller AS: A review of diagnosis and treatment of acne in adult female patients. Int J Womens Dermatol 2017;4:56-71.

2. Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al: Guidelines of care for the management of acne vulgaris. *J Am Acad Dermatol* 2016;74:945-73.
3. Murase JE, Heller MM, Butler DC: Safety of dermatologic medications in pregnancy and lactation: Part I. Pregnancy. *J Am Acad Dermatol* 2014;70:401.
4. Bagatin E, Freitas THP, Machado MCR, et al: Adult female acne: a guide to clinical practice. *An Bras Dermatol* 2019;94:62-75.
5. Butler DC, Heller MM, Murase JE: Safety of dermatologic medications in pregnancy and lactation: Part II. Lactation. *J Am Acad Dermatol* 2014;70:417.
6. Kohno S, Yamaguchi K, Yasuoka A, et al: Clinical evaluation of 12 cases of antimicrobial drug-induced pneumonitis. *Jpn J Med* 1990;29:248-54.
7. Kaur J, Khandpur S, Seith A, Khanna N: Dapsone-induced eosinophilic pneumonitis in a leprosy patient. *Indian J Lepr* 2005;77:267-71.