

Sklerotik ve Pigmente Yamalar

Sclerotic and Pigmented Patches

Hazırlayan: Şehriyar Nazari
İstanbul Şafak Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Yirmi üç yaşında bayan hasta 8 aydan beri yüz ve gövdenin bazı bölgelerinde oluşan pigmente ve sklerotik yamalar ve plaklar ile kliniğe başvurdu. Hastanın sorgulaması ve incelemesinde 2.5 yıllık AML vakası olduğu tespit edildi. Tanınız nedir?

Bir önceki sayıda yer alan olgunun tanısı

Nevus Komedonikus
Nevus Comedonicus

Genellikle çocukluk veya ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan nevus komedonikus, benin gelişimsel nevuslar grubunda sınıflandırılır. En sık olarak yüz, gövde üst kısmı ve üst ekstremitelerde ortaya çıkar. Komedon benzeri papüllerin gruplaşması ile oluşan plak şeklindedir. Çoğunlukla lineer, soliter ve unilateraldir. Nevus komedonikus asemptomatik bir lezyon olup sadece kozmetik açıdan sorun oluşturabilir, ancak bazen papüler lezyonlarda enflamasyon gelişir ve lezyon akne vulgaris ile karışabilir. Histolojik olarak komedonlar keratin dolu kıl folikülleri şeklindedir. Tedavide topikal retinoidler kısmen etkili olup tam iyileşme sadece cerrahi eksizyon ile mümkündür.

Doğru yanıt verenler arasında çekilen kura sonucu armağan kazanan şanslı meslektaşımız; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Dr. İlhan Çeçen



Resim 1.

Yanıtlarınızı
semrademirel@turkderm.org.tr
adresine gönderebilirsiniz.
Doğru yanıt verenler arasında yapılacak kura ile belirlenecek şanslı meslektaşımıza kitap armağan edilecektir.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Dr. Şehriyar Nazari, İstanbul Şafak Hastanesi, İstanbul, Türkiye
Tel.: 0212 614 56 56/1056 E-mail: s.nazari@yahoo.com