

Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesindeki 50,645 Servikal Smear Sonucunun Değerlendirilmesi

Evaluation of 50,645 Cervikal Smear Results
in Zeynep Kamil Maternity and Pediatric Research and Training Hospital

Nermin Koç¹

1. Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Amaç: Servikal kanser dünyada kadınlar arasında en yaygın ikinci kanserdir ve gelişmekte olan ülkelerde, meme kanserinden sonra, kadınların malignitelerden ölümlerinin en sık nedeni olduğu düşünülmektedir. Erken dönemde tanısı için, Pap smear testi yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada bölümümüzdeki servikal smear sonuçlarını değerlendirmeyi, bulgularımızı yine bölümümüzde, 2000-2005 yılları için yapılan benzer bir çalışmayla karşılaştırmayı ve literatür bilgileri eşliğinde tartışmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 - Şubat 2016 arasındaki 50.465 Pap smear sonucunu geriye dönük olarak inceledik.

Bulgular: Ortalama hasta yaşı 44 (17-82) idi. Sitopatolojik inceleme sonuçlarında 7200 (%14) inflamasyon, 988 (%1.95) ASCUS, 187 (%0.37) ASC-H, 370 (%0.73) LSIL, 130 (%0.25) HSIL, 41 (%0.08) AGC, 3 skuamöz hücreli karsinom, 2 adenokarsinom saptandı. Atipik skuamöz hücrelerin (ASCUS ve ASC-H), skuamöz intraepitelial lezyona oranı 2.35 idi.

Sonuç: Çalışmamızda servikal sitolojik anormalliklerin oranı %3.4 tür. Türkiye'den birçok farklı sonuç bildirilmiştir. Gerçek yaygınlığı saptamak için daha geniş vaka serileriyle daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: servikal kanser; pap smear; tarama

ABSTRACT

Objective: Cervical cancer is the second most common type of cancer among women worldwide and considered to be the major cause of death from malignancy in women in developing countries after breast cancer. To detect cervical cancer at very early stages, Pap smear test is used widely. In this study we aimed to evaluate the cervical smear results of the women in our department and to compare with the results of a similar study that had been done for the years 2000-2005 and to discuss in the light of the literature.

Material and Method: We performed a retrospective research on 50.465 Pap smear results between January 2012 and February 2016.

Conclusion: The prevalence of cervical cytological abnormalities in our study was %3.4. Many different results were published from Turkey. To determine the real prevalence, more studies with larger numbers are needed.

Keywords: cervical cancer; pap smear; screening

İletişim Bilgileri:

Sorumlu Yazar: Nermin KOÇ

Yazışma Adresi: Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Patoloji Kliniği, Üsküdar, İstanbul

E-posta: nerminkoc@yahoo.com

Tel: +90 (532) 640 03 80

Makalenin Geliş Tarihi: 04.03.2016

Makalenin Kabul Tarihi: 25.04.2016

DOI: <http://dx.doi.org/10.16948/zktb.36577>

GİRİŞ

Servikal kanser kadınlar arasında ikinci en yaygın kanser tipidir. Her yıl 500,000 yeni vaka ve 250,000 ölüm bildirilmektedir (1, 2). Gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olduğu halde, Türkiye’de yaygınlığı Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerine göre daha düşük orandadır (3). Ülkemize ait epidemiyolojik veriler az olmakla birlikte 2003 deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde servikal kanser, tüm kadın kanserlerinde 10. sıradadır ve görülme oranı 100,000 de 4.76’dır (2). Servikal prekan-seröz ve kanseröz lezyonların erken tanısında Pap smear testi, basit noninvaziv ve ucuz bir yöntemdir. Konvansiyonel yöntemin duyarlılığı %30-70, özgüllüğü %86-100 dür. Sıvı bazlı sitolojinin duyarlılığı %61-95, özgüllüğü %78-82’dir (4). Etkin ve yaygın bir şekilde kullanımının, serviks kanseri riskini %35-80 oranında azalttığı düşünülmektedir (5). Tarama programları gelişmiş ülkelerde yaygın ve sistemik olarak kullanılırken, ülkemizde birkaç pilot bölge dışında tam olarak uygulanamamaktadır (6, 7). Gerçekçi tarama programlarının oluşturulabilmesi için ülkemizdeki gerçek yaygınlığını ve popülasyonlara göre dağılımını, artış veya azalış eğilimini bilmek önemlidir.

Çalışmamızda hastanemiz jinekoloji polikliniklerine başvuran hastalardan alınan servikal smear sonuçlarını inceledik, premalign ve malign lezyonların oranlarını belirlemeye ve literatür eşliğinde tartışmaya çalıştık

MATERYAL ve METOD

Çalışmaya Ocak 2012- Şubat 2016 arasında hastanemiz patoloji laboratuvarında değerlendirilen 50,465 vaka alındı. Aynı hasta için yineleyen smearler, bilinen jinekolojik malignite öyküsü olanlar, histerektomize hastalar çalışma dışı bırakıldı. Smearler sıvı bazlı (thinprep) prosedürüne göre otomatik olarak hazırlanıp, Papanicolaou ile boyandı. Patoloji uzmanları tarafından 2001 yılı Bethesda derecelendirme sistemine göre; önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASCUS), yüksek dereceli lezyonun dışlanamadığı atipik skuamöz hücreler(ASC-H), düşük dereceli skuamöz intraepitelial lezyon (LSIL), yüksek dereceli skuamöz intraepitelial lezyon (HSIL), atipik glandüler hücreler (AGC), skuamöz hücreli karsinom (SCC), adenokarsinom olarak değerlendirildi.

BULGULAR

Ortalama hasta yaşı 44 idi (17-82). 515 (%1.1) smear yetersiz idi. 7,200 (%14) vaka da inflamasyon mevcuttu. 1,721 vakada (%3.4)

epitelyal hücre anormallikleri tespit edildi. Bunlardan 988’i (%1.95) ASCUS, 187’si (%0.37) ASC-H, 370’i (%0.73) LSIL, 130’u (%0.25) HSIL, 41’i (%0.08) AGC, 3’ü skuamöz hücreli karsinom, 2’si adenokarsinom idi (Tablo 1). Atipik skuamöz hücrelerin, skuamöz intraepitelial lezyona oranı (ASC/SIL) 2.35 idi.

Tablo 1: Servikal Sitoloji Sonuçları

Servikal Sitoloji	Vaka Sayısı	Oran(%)
Normal	41029	81
İnflamasyon	7200	14
Yetersiz	515	1.1
ASCUS	988	1.95
ASC-H	187	0.37
LSIL	370	0.73
HSIL	130	0.25
AGC	41	0.08
SCC	3	
Adenokarsinom	2	

TARTIŞMA

Serviks kanseri halen kadınlarda 2. en sık görülen kanserdir ve 2002 de dünya çapında 239,000 kadının ölümüne neden olmuştur (6). Servikal lezyonların premalign aşamada tespit ve tedavi edilmesi hastalığa yakalanma ve hastalıktan ölüm oranlarını düşürür. Pap smear ile tarama yöntemi 1942’de Papanicolaou tarafından tanımlanmış, maliyet açısından etkin, noninvaziv, basit ve etkili bir yöntemdir (8, 9). Tayvan’dan yapılan bir çalışmada 1995-2006 yılları arasında Papsmear ile servikal kanser tarama programı uygulanarak kanser oranı %47.8 azaltılmıştır (9). Gelişmiş ülkelerde serviks kanserinin daha az görülmesinin nedeni Pap smear metodunun 50 yıldır etkin bir şekilde kullanılmasıyla açıklanmıştır (1, 5, 6). Pap smear yapılma oranları Pakistanda %2.6, Güney Afrikada %27, Amerika Birleşik Devletlerinde %93’tür (5). Türkiye’de ise değişik bölgelerden farklı sonuçlar bildirilmiştir. Erbil ve arkadaşlarına göre %11.8, Gürel ve arkadaşlarına göre %30.4, Karaca ve arkadaşlarına göre %16.2, Akyüz ve arkadaşlarına göre ise %51.2 dir (5, 10, 11, 12). Ülkemizin genelini yansıtan epidemiyolojik çalışmalar maalesef az sayıdadır.

Pap smear yönteminin etkinliğini saptamak için kullanılan bazı kalite kontrol yöntemleri mevcuttur. Anormal smear oranı (anormal epitelyal hücre oranı) ve ASC/SIL oranı en

yaygın sıklıkla kullanılanlardır (13). Anormal smear, ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC ve karsinomların toplamıdır. Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde bu oran %1.5-7.3 arasında değişmekte iken, ülkemizde %1.2-12.6 dir (13). Türkmen ve arkadaşlarının çalışmasında ise %4.3'tür (13). Türk Servikal Kanser ve Servikal Sitoloji Araştırma grubunun (TSK ve SSA grup) yaptığı Türkiye genelini yansıtan, toplam 140,334 hastanın değerlendirildiği bir çalışmada ise bu oran %1.8'dir (14). Çalışmamızda bu oran % 3.4 ile bu değer üstündedir. Bu sonuç belki de popülasyonumuzun servikal lezyonlar için risk grubunda olan düşük-orta sosyoekonomik düzeyiyle ilgili olabilir. ASC/SIL oranı ise ASCUS ve ASC-H' in toplamının LSIL ve HSIL in toplamına oranıdır. Önerilen oran bazı çalışmalarda 2-3 arası bazıları ise 0.87 ve 4.49 arasındadır (13, 15). Ülkemizde ise değişik çalışmalarda 3.28 ve 12.6 arası rakamlar bildirilmiştir. Türkmen ve arkadaşlarının çalışmasında %2.12'dir (13). Yine aynı grubun (TSK ve SSA grup) çalışmasında bu oran 2.83'tür (14). Çalışmamızdaki oran 2.35 olup bu değere yakındır.

Ülkemizdeki anormal servikal sitoloji sıklığı Avrupa ve Kuzey Amerika'ya göre daha düşüktür (14, 2). Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir çalışmada ASCUS, LSIL, HSIL, AGC oranları sırasıyla %3.9, %2.1, %0.5, %0.2 olarak bildirilmiştir (2). Ülkemizde ise farklı çalışmalarda farklı sonuçlar mevcuttur. Karabulut ve arkadaşlarının çalışmasında ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL oranları sırasıyla %0.54, %0.15, %0.07 dir (16). İnal ve arkadaşlarının 32,026 vakalık çalışmasında sırasıyla %1.9, %0.1, %0.5, %0.1, %0.2'dir (17). Eroğlu ve arkadaşlarının çalışmasında %0.5, %0, %0.02, %0.02 (18), Öner ve arkadaşlarının çalışmasında ise %1.08, %0, %0.036, %0.036 dir (19). Çelik ve arkadaşlarının çalışması ise en yüksek değerlere sahiptir; toplam atipik skuamöz hücrelerin (ASC) oranı %4.8, LSIL %1.8, HSIL %1.1, AGUS %0.9 dur (20). Türkiye genelini yansıtan aynı grubun (TSK ve SSA grup) çalışmasında bu oranlar sırasıyla %1.07, %0.07, %0.3, %0.17 ve %0.08 dir (14). Bizim çalışmamız sırasıyla %1.95, %0.37, %0.73, %0.25 ve %0.08 ile İnal ve arkadaşlarının sonuçlarına yakındır. Şüphesiz ki bu sonuçlar çalışmalara dahil edilen farklı popülasyonlar, farklı risk grupları ve vaka sayısındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

2000-2005 yıllarını kapsayan, yine hastanemizde ve yine aynı uzunlukta bir zaman diliminde yapılan, bir çalışmada ise toplam 28,649 pap smear değerlendirilmiştir (21). Anormal epitelyal hücre oranı, %2.93'tür ve ASCUS, ASC-H, LSIL, HSIL, AGC oranları sırasıyla

%2.45, %0, %0.23, %0.15, %0.1'dir. Bizim çalışmamızda, bu çalışmaya göre hem vaka sayısı artmış, hem de anormal epitelyal hücre oranları artmıştır (sırasıyla 50,465 ve %3.4). Anormal epitelyal hücre oranındaki artış gerçek bir artış olabileceği gibi, bu dönemdeki smearlerin konvansiyonel yöntemlerle değerlendirilmesinden, çalışmamızda ise sıvı bazlı sitolojinin kullanılmasından da kaynaklanıyor olabilir. Bilindiği üzere sıvı bazlı sitolojinin, epitelyal anormallikleri saptama oranının daha fazla olduğuna dair görüşler mevcuttur (21).

Sonuçta servikal sitoloji anormalliklerinin sıklığı değişiklik göstermektedir. Etkin ve yaygın tarama programları, aynı popülasyonda farklı zamanlı çalışmaların yapılması ve karşılaştırılması ile ülkemizdeki gerçek oranları ve yıllar içindeki artma veya azalma eğilimini tespit etmek mümkün olacaktır.

KAYNAKLAR

1. Isaoglu U, Yilmaz M, Delibas IB., Bilici AE, Kabalar M E. Evaluation of 37, 438 consecutive cervical smear results in the Turkish population. *Arch Med Sci* 2015; 11(2): 402-5.
2. Atilgan R, Celik A, Boztosun A, Ilter E, Yalta T, Ozercan R. Evaluation of cervical cytological abnormalities in Turkish population. *Indian J Pathol Micro* 2012; 55(1): 52-5.
3. Yilmaz HH, Yazıhan N, Tunca D, Sevinç A, Olcayto EÖ, Özgül N, et al. Cancer trends and incidence and mortality patterns in Turkey. *Jpn J Clin Oncol* 2011;41(1):10-6
4. Kulasingam SL, Hughes JP, Kiviat N B, Mao C, Weiss NS, Kuypers JM, Koutsky LA. Evaluation of human papillomavirus testing in primary screening for cervical abnormalities: comparison of sensitivity, specificity, and frequency of referral. *Jama* 2002; 288(14): 1749-57.
5. Erbil, N, Tezcan Y, Gür EN, Yıldırım M, Alış N. Factors affecting cervical screening among Turkish women. *Asian Pac J Cancer Prev* 2010; 11(6): 1641-4.
6. Demirhindi H, Nazlican E, Akbaba M. Cervical Cancer Screening in Turkey: A Community-Based Experience after 60 Years of Pap Smear Usage. *Asian Pac J Cancer Prev* 2012; 13(12): 6497-500.
7. Uysal A, Birsal A. Knowledge about cervical cancer risk factors and pap testing behaviour among Turkish women. *Asian Pac J Cancer Prev* 2009;10(3): 345-50.
8. Yang BH, Bray F I, Parkin DM, Sellors J W, Zhang ZF. Cervical cancer as a priority for prevention in different world regions: an evaluation using years of life lost. *Int J Cancer* 2004; 109(3): 418-24.
9. Chen YY, You SL, Chen CA, Shih LY, Koong SL, Chao KY, et al. Effectiveness of national cervical cancer screening programme in Taiwan: 12-year experiences. *Brit J Cancer* 2009; 101(1): 174-7
10. Gürel SA, Gürel H, Topçuoğlu A. Investigation of rate and determinants of Pap-test in women attending for a gynecological examination. *Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst* 2009; 19(2): 62-6.

11. Karaca M. How common is pap smear test known and performed. *Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst* 2008; 18(1): 22-8
12. Akyüz A, Güvenç G, Yavan T, Çetintürk A, Kök G. Evaluation of the Pap smear test status of women and of the factors affecting this status. *Gulhane Med J.* 2006; 48(1):25-9.
13. Türkmen İÇ, Başsüllü N, Korkmaz P, Güneç B, Baykal C M, Güdücü N, et al. Patients with Epithelial Cell Abnormality in PAP Smears: Correlation of Results with Follow-Up Smears and Cervical Biopsies/PAP Smearde Epitel Hücre Atipisi Saptanan Hastalar: Sonuçların Takip Smear ve Servikal Biyopsi ile Uyumluluğu. *Türk Patoloji Derg* 2013;29(3): 179-84.
14. Cancer, Turkish Cervical, and Cervical Cytology Research Group. Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey. *Int J Gynecol Obstet* 2009;106(3): 206-9.
15. Nascimento AF, Cibas ES. The ASC/SIL ratio for cytopathologists as a quality control measure. *Am J Clin Pathol* 2007; 128(4): 653-6.
16. Karabulut A, Alan T, Ekiz MA, İritiş A, Kesen Z, Yahşi S. Evaluation of cervical screening results in a population at normal risk. *Int J Gynecol Obstet* 2010 ;110(1): 40-2.
17. Inal MM, Köse Ş, Yıldırım Y, Özdemir Y, Töz E, Ertopçu K, et al. The relationship between human papillomavirus infection and cervical intraepithelial neoplasia in Turkish women. *Int J Gynecol Cancer* 2007; 17(6): 1266-70.
18. Eroğlu C, Unlu Y, Eryılmaz MA, Gonenc O. Cervicovaginal smear screening experience early cancer diagnosis-screening and Education Center Konya Education and Research Hospital. *Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi* 2008; 21: 91-6.
19. Oner S, Demirhindi H, Erdogan S, Tuncer I, Akbaba M. Gynecologic examination findings and pap smear screening results of women in Dogankent, Turkey. *Türk J Public Health* 2004; 2(2); 85-91.
20. Celik C, Gezginc K, Toy H, Findik S, Yilmaz O. A comparison of liquid-based cytology with conventional cytology. *Int J Gynecol Obstet* 2008; 100(2): 163-6.
21. Yalti S, Gürbüz B, Bilgic R, Cakar Y, Eren S. Evaluation of cytologic screening results of the cervix. *Int J Gynecol Cancer* 2005; 15(2): 292-4.
22. Akamatsu S, Kodama S, Himeji Y, Ikuta N, Shimagaki N. A comparison of liquid-based cytology with conventional cytology in cervical cancer screening. *Acta Cytol* 2012; 56(4): 370-4.